1. # Observation Sur une fracture de L'os Ilion donnée par Mr. Menjon Chirurgien de St. Cosme

Le 28 Xbre 1734 Je fus mandé par le Sr. Morise Me. Coutelier à Paris, lequel Se plaignoit d'une douleur des plus vives et des plus Considerables que lon puisse exprimer;

Cette douleur Setendoit Sur toute la Circonference de la Crete de l'os des Iles du coté gauche et Se continuoit jusqua la partie moyenne de la Cuisse, Il y avoit outre cela une fievre tres considerable et une difficulté de respirer tres grande

Je demanday au malade depuis quel temps il etoit dans ce triste Etat, Il me repondit que le Jour precedent ayant voulu aller chercher du Charbon de terre au port St. Nicolas, quil estoit tombé dans le fond dun grand Bateau quy estoit à vuide, et que dans L'Instant de Sa Chutte il avoit ressenty un Bruit Sourd à la partie Superieure de la Cuisse et une douleur Sy considerable quil en estoit tombé en deffaillance, De Sorte quil luy avoit esté Impossible de Se relever tel Effort quil peut faire, jusqua ce quil eut du Secours pour Laider à Sortir de Lendroit ou il estoit tombé;

Il ajouta meme quapres quon leut Sorty du Bateau, et mis Sur Son Seant, il avoit ressenty le meme Bruit que dans L'Instant de Sa chutte ce quy Lempecha de Se tenir debout et quon fut par consequent obligé de le transporter chez luy Sur un Brancard

Sur Son Exposé je presumay quil pouvoit y avoir fracture ou Luxation à la Cuisse, et pour men asseurer, je commencay par Examiner la partie malade, Japercus au premier

ARC 31 d. 6 2 929
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Coup Dail vn gonflement des plus Enormes et vne Ekimose tres considerable non Seulement Sur toute la fesse, mais encore Sur la Cuisse et presque tout le bas ventre quy estoit tendu considerablement, Et lors que je voulus toucher cette capacité pour massurer de Son Etat, le malade Se plaignit dune douleur tres vive dans cette partie, Ce quy mengagea à demander au malade Sil avoit fait quelque Evacuation depuis Sa chutte Soit par les Selles ou par les Vrines, Il me repondit quil nen avoit pas resenty aucun Besoin, Cela me fit Juger que ces accidents estoit Leffet de la Contusion et de la Secousse que les visceres du bas ventre avoit Souffert dans le temps de la Chutte;

Et comme je Soupçonnois Sur lexposé que le malade mavoit fait quil pouvoit y avoir fracture ou Luxation à la Cuisse, je poussay mes reflexions plus loin pour men assurer avec certitude en examinant cette partie dans toute Son Etendue, ce que jeus beaucoup de peine à reconnoitre par rapport au gonflement considerable quy y estoit, Dailleurs la Cuisse et la Jambe estoit dans Sa rectitude naturelle

Cependant par les differents mouvements que je fis faire à la tete du femur et ayant porté ma main Sur Letendue des los des Iles, jy Sentis vne Crepitation Sourde mais asez Sensible et Etendue principalement Sur Sa partie moyenne pour mannoncer que ~~L'Ilion~~ los des Iles estoit fracture, + ~~dans Sa longueur~~ Selon la longueur du corps + Et pour men assurer davantage je fis lever le malade pour examiner avec plus dexactitude la partie affectée jappliquay pour cet effet mes deux mains, lune Sur le coté opposé à la fracture et Lautre Sur Lendroit ou javois Senty la Crepitation de Sorte que par des mouvements opposez que je faisois Sur cette partie je Sentis

3 vne Seconde fois le mouvement Bruyant que jaurois apercue auparavant, Dailleurs le malade ne fut pas plutot levé quil quil trouva la douleur considerablement augmentée et ne peut point rester long temps dans cette Scituation

Mais comme je voyois que les accidents que jay annoncez cy dessus estoit plus vrgens que la fracture je ne perdis point de temps pour les combattre, Je commencay par penser le malade et me servis pour cet Effet de L'Emplatre Stirax animé deau de vie camphrée que jappliquay depuis la Circonference de la Crete des los des Isles en couvrant la fesse, jusqua la partie moyenne de la Cuisse ou la Contusion et lekimose estoit bornée des compresses trempées dans la meme liqueur par dessus, le tout contenu par vn Bandage Contentif;

Et comme le bas ventre estoit fort tendu et douloureux comme il à été dit Je fis vne Embrocation avec Les huiles de Camomille melilot et de vers animée dun peu deau de vie et jappliquay par dessus des flanelles trempées dans la ~~decoction~~ decoction Emoliente, le malade fut Seigné dans L'Instant et trois heures après la Seignée fut réiterée, Je fis donner vn Lavement emolient au malade quil ne rendit point et quatre heures après on luy en donna vn autre de meme, quy eut le meme Sort

Je luy ordonnay vne potion diuretique et adoucissante faitte avec Lhuile damandes douces leau de parietaire et le Sirop dalthea, afin de tacher de procurer quelque Evacuation joint aussy bien que le Regime de vivre tres Severe, attendu que le malade estoit fort et robuste

Le lendemain je trouvay ~~le malade quy Se plaignoit~~ que les ~~des memes~~ douleurs persevoroit ~~que le jour precedent~~, Sur tout à la

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

+

4. Region Lombaire ouil trouuoit quelles auoit augmenté,
~~jaypercuy~~ Je trouuay meme que la fieure estoit plus forte, les euacuation
nestoit encore point ~~supprimée~~ venües malgré les precautions quejauois prises;
et le ventre estoit toujours dans le meme Etat, ce quy fit que je
le Seignay pour la troisieme fois et luy fis donner ~~le meme~~
un Semblable lauement, la potion fut reiterée et les topiques furent
aussy continuez En renouuellant ceux du bas ventre de —
trois en trois heures et ceux de la Cuisse deux fois le Jour, Je
fis Seigner le malade sur le midy pour la quatrieme fois;

Je fus le soir ledsoir je trouuay que les vrines auoit —
commencé à percer et quil en auoit rendu enuiron vn
demy verre mais les lauements nauoit fait encore aucun
effet, le ventre estoit toujours dans le meme Etat, et la —
fieure nauoit point diminué depuis le matin, Je leuay —
lappareil je ne mappercevs daucune diminution á leKimose
ny à la Contusion de la fesse et de la Cuisse, je le pensay de
meme que le Jour precedent, les memes remedes furent aussy
administrez et il fut Seigné pour la cinquieme fois

Le lendemain troisieme Jour de la maladie je trouuay ~~à la~~
~~leuée de Lappareil~~ que la tumeur Contusion et leKimose estoit tant
Soit peu diminuée, et le malade me dit quil ne Sentoit —
plus la douleur Sy viue quauparauant, Cela ne —
mempecha pas de le resseigner pour la Sixieme fois, Et le
Soir la Seignée fut reïterée parce que non Seulement le
ventre estoit encore ~~tendu et~~ douloureux, mais aussy parce
que la fieure estoit ~~toujours~~ quasy dans le meme Etat

Jay continuay les memes remedes que jay dit cy dessus jusquau
Septieme Jour de la maladie que les Euacuations furent bien

5.

Etablies, ~~aussy bien que~~ et la fievre quy avoit disparu le 6.e Jour n'y ayant pour lors que tres peu de gonflement et de Kimose Cest pour lors que je me determinay à maintenir la fracture mais comme ces Especes de fractures Sont assez rares ainsy que le remarque tres Sçauamment Monsieur Petit dans Son traitté des maladies des Os Et que dailleurs je nen avois jamais "veu ny" traitté une Semblable, estant Lunique quy mest tombée entre les mains, Jappellay Monsieur Boudou pour Consultant il trouua par Lexamen quil fit, la fracture telle que je lavois reconnue et fut dauis de la reduire et maintenir Sur le champ ce que je fis en Sa presence

Je mis le malade Sur le bord du lit couché Sur le coté opposé à la fracture, deux oreillers Sous luy lun Sous le coté et lautre Sous la cuisse au moyen de quoy la partie opposée à la fracture portoit à faux, de Sorte que les musles du Bas ventre et les fessiers Se trouuoit relachez, Ensuitte je reduis la fracture en appuyant mes mains Sur toute Letendue de los Ilion, quoy que dans ce cas la il ny est pas vn deplacement Sensible attendu que la fracture estoit en long jay creu neanmoins estre obligé de faire cette conformation pour estre plus Seur dune Exacte reunion Ensuitte jappliquay deux bonnes compresses en quatre doubles qui prenoit depuis los Sacrum, Se continuoit Sur la crete de los des Iles jusqua la partie moyenne du ventre Inferieur en Couvrant toute la fesse et la Cuisse, le tout contenu par vn bandage convenable et trempé dans Leau de vie, Jeus Soin de Situer la partie auecq les conditions requises et de faire arroser le bandage vne fois par Jour Jusqua au deuxieme pensement que je fis quinse Jours apres, De Sorte qua la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

levée du premier appareil la Contusion et le Kimose furent
entierement dissipées Cest pour lors que je permis au malade
un peu de nourriture

Je ne levay ce second appareil que le trente de la reduction
je vis avec satisfaction que la fracture se reunissoit fort
bien parce que le malade commencoit à faire quelque
mouvement de la ~~parti~~ cuisse [illegible]tée Je me conduisis dans
lapplication de cet appareil de meme quaux precedens
en luy faisant toujours garder la meme situation et
ne levay ce dernier que le quarantieme jour que le malade
est parfaitement guery sans en avoir ressenty depuis ce temps
aucune Incommodité Menjon

n°. B. 4.